

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Feminella® makšties ovulės

Sudėtis

Kiekvienoje 1,7 g makšties ovulėje yra 5 mg natrio hialuronato; 10 mg sintetinio vitamino E; ekstraktų iš 60 mg azijinės raistenės, 60 mg dedešvos, 60 mg ramunėlių ir 2 mg arbatmedžių aliejaus; 20 mg koloidinio silicio dioksido ir 1483 mg pusiau sintetinių gliceridų.

Indikacijos

Feminella® ovulės vartojamos makšties gleivinei drėkinti, esant makšties sausumui dėl hormonų kiekio pokyčių bet kuriuo gyvenimo laikotarpiu, ypač menopauzės periodu, po gimdymo ir žindymo laikotarpiu, arba dėl chemoterapijos ar spindulinio gydymo.

Dėl drėkinamojo poveikio Feminella® ovulės lengvina makšties atrofijos simptomus (pvz., niežulį, deginimą, tempimą bei nemalonius pojūčius lytinių santykių metu).

Dozavimas

Vartoti po vieną makšties ovulę 10 parų iš eilės arba pagal gydytojo nurodymus.

Makšties sausumas menopauzės laikotarpiu

Pradinis gydymas. Pirmas 10-20 parų vartoti po vieną ovulę per parą.

PalaiKOMASIS gydymas. Vartoti po 1 ovulę 2 kartus per savaitę.

Vartojimo būdas

Feminella® ovulės vartojamos į makštį.

Išimkite ovulę iš lizdinės plokštelės ir atplėškite nuo juostelės. Lėtai perplėškite plėvelę, suėmę abiejų rankų nykščiais ir smiliais. Atsargiai išimkite ovulę iš plastiko plėvelės ir pirštu švelniai įstumkite giliai į makštį. Tai daryti geriausia prieš miegą.

Kontraindikacijos

Alergija (padidėjęs jautrumas) bet kuriai Feminella® ovulių medžiagai.

Įspėjimai

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Lizdines plokšteles laikyti kartono dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės ir šviesos.

Kartu su kitokiomis makšties ovulėmis (pvz., kontraceptinėmis) ar prezervatyvu vartoti negalima.

Mėnesinių metu ar gausių makšties išskyrų atveju vartoti negalima.

Nėštumo metu Feminella® ovulių galima vartoti tik gydytojo nurodymu.

Ilgai vartojamos ovulės nedažnai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijų. Tokiu atveju vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją.

Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Feminella® ovulių vartoti negalima.

Prieš vartojimą atidžiai nusiplaukite rankas. Iš lizdinės plokštelės išimtą ovulę vartokite tuoj pat. Jeigu lizdinė plokštelė pažeista, ovulių vartoti negalima.

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Vartojimo instrukcija paskutinį kartą peržiūrėta: 2020 m. vasario 18 d.

Gamintojas

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco







A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181 Roma (Italija)

Platintojas Lietuvoje

UAB "Pharmalita"

Žirnių g. 26, LT-02120 Vilnius

SIMBOLIAI	
Gamintojas	
CE ženklas	
Partijos kodas	
Naudoti iki	
Žiūrėkite naudojimo taisykles	
Temperatūros apribojimas	
Pakartotinai nenaudoti	